

DESPRÉS DE LA DETECCIÓ... ASPECTES A TENIR EN COMPTE



La detecció i intervenció precoç són imprescindibles. Aquest és un període clau en el procés de neurodesenvolupament i la construcció de la identitat de l'infant, així com per l'establiment de la relació amb els seus pares.

Hi ha professionals a la xarxa pública amb competències per fer una valoració i intervenció adequades (CDIAP).

Com informar als pares: Cal contenir a la família i transmetre la preocupació sense sobre-alarmar. Uns pares i mares conscients però no espantats seran els que més fàcilment podran fer la consulta.

ENLLAÇOS D'INTERÈS:

Informació del desenvolupament normal i senyals d'alarma de TEA

- **Autism Speaks:** www.autismspeaks.org/what-autism/learn-signs
- **Autism navigator:** www.autismnavigator.com
- **Abans de les primeres paraules:** www.abansprimeresparaules.upf.edu
- **Canal Salut de la Generalitat de Catalunya** www.canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/a/autisme/autisme/

Serveis d'atenció en TEA de la xarxa pública catalana

- **Xarxa ediaaps:** www.acap.cat/ i www.uccap.com/
- **Serveis d'atenció a la Salut mental del Catsalut:** www.canalsalut.gencat.cat

CENTRE DE FORMACIÓ I RECERCA



Serveis per les persones amb autisme

Amb la col·laboració de:



SENYALS D'ALARMA DE RISC DE TEA EL PRIMER ANY DE VIDA

EL QUE PUGUIS FER AVUI NO HO DEIXIS PER DEMÀ

Un 30-40% dels pares havien manifestat preocupació abans de l'any

Les **senyals d'alarma** de dificultats en la comunicació i la relació, compatibles amb el **Transtorn de l'Espectre Autista (TEA)**, apareixen i **es poden detectar durant el primer any de vida**

Població vulnerable:

- germans (20%), bessons monozigòtics (80%) i antecessors directes a la família,
- gran prematurs (25%),
- infants que pateixin llargues hospitalitzacions,
- infants adoptats,
- infants maltractats o negligits,
- nadons de mares amb depressió i trastorns psiquiàtrics,
- infants amb discapacitat física, psíquica i/o sensorial.

La **consulta pediàtrica**, les **escoles bressol** o els **espais familiars** són contextos naturals on es poden observar aquestes senyals d'alarma i recollir les preocupacions dels pares.




SENYALS D'ALARMA DE RISC DE TEA

INiCi 0-6 Mesos



INiCi 6-12 Mesos



CERCA DE SENSORIALITAT: en els objectes o en un mateix. Moviments estereotipats.
ALTERACIONS MOTRIUS: hipotonia o hipertonia, dificultats d'integració de línia mitja, asimetries i no desaparició de reflexes primaris.
ATRACTIU: L'adult sent poc plaer en la relació amb l'infant i dificultats per establir-la.
ESTIL RELACIONAL DE LA FAMÍLIA: Excés d'estimulació o allunyament, formes peculiars de relacionar-se.



Major interès
pels objectes
que per les
persones

SENYALS D'ALARMA

- Presència signes patològics
- Absència conductes pròpies del desenvolupament típic
- Diferències qualitatives en el desenvolupament de competències i conductes
- **En l'infant, la família i la relació**
- **Per excés i per defecte**, sorollosos - silenciosos
- Qualitatius - quantitius
- **> 2-3 signes, importància intensitat, freqüència i duració**

Els examinadors dediquen **menys temps** en identificar la presència de competències en nens amb desenvolupament típic que amb autisme

Dedica un temps a observar sense intervenir!