



Protocolo en caso de crisis epilépticas: convulsivas y no convulsivas

Neuropediatria, CDIAP Garraf

Dra. M. J. González



Protocolo de actuación

En caso de presentar crisis se sugiere:

Colocar al paciente en posición lateral, evitar que se golpee, sin intentar retirar ni introducir nada en la boca, con la cabeza ligeramente extendida y hacia abajo.

Intentar mantener la calma, controlar si la crisis dura más de 5 minutos, se sugiere colocar medicación de rescate:

- . **Stesolid Diacepam 5mg / rectal** si peso menos de 20kg
- . **Stesolid Diacepam 10mg / rectal** si peso mayor de 20kg

Si la crisis persiste a pesar de indicada la medicación, luego de 10 minutos, se sugiere llamar al SEM o asistir a UCIEs.

María Julieta González
Colegiado 46715
Neuropediatra

Stesolid rectal

- Dosis Diacepam 5mg si peso menor de 20 kg
- Dosis Diacepam 10mg si peso mayor de 20kg





Buccolam



Buccolam

Intervalo de edad	Dosis	Color de la etiqueta
3 a 6 meses hospital	2,5 mg	Amarilla
>6 meses a <1 año	2,5 mg	Amarilla
1 año a <5 años	5 mg	Azul
5 años a <10 años	7,5 mg	Morada
10 años a <18 años	10 mg	Naranja

